

Before X

Tris-EDTA tartalmú steril puffer oldat krónikus pyoderma kezelésére.

Hatóanyaga:

Tris-EDTA

Alkalmazása:

- Krónikus vagy visszatérő pyoderma esetén
- Krónikus vagy visszatérő fülgyulladás esetén
- Fisztula és tályog esetén

Tulajdonságai:

A Before X egy magas iontartalmú, 8-as pH értékű puffer oldat. A puffer oldatok jellegzetes tulajdonsága, hogy hígítás vagy kis mennyiségű sav vagy bázis hozzáadásakor pH értékük alig változik.

Hatása: **Több in vitro kísérlet kimutatta, hogy a Tris-EDTA hatékony a Gram-negatív baktériumok (P. aeruginosa, E. coli Proteus fajok) ellen.**

A Before X szinergista módon erősíti számos antibiotikum hatását (aminoglikozidok, fluorokinolonok stb.)

A klórhexidin oldat helyi alkalmazásának hatását 1000-szeresére fokozza a Before X együttes használata. A Tris-EDTA nem képes az élesztőgombák (Malassezia, Candida albicans) növekedésének visszaszorítására.



Before X

Tris-EDTA tartalmú steril puffer oldat,
krónikus pyodermák kezelésére.

Használata:

Klórhexidin tartalmú készítmény alkalmazása előtt javasolt, innen ered a termék neve: Before X.

Krónikus vagy visszatérő pyoderma esetén: tisztítsuk meg a felületet tisztító és fertőtlenítő hatású samponnal (Clorexyderm Forte Sampon). Szárítsuk meg a területet, majd cseppentsünk rá 2-5 ml Before X-et naponta háromszor 14 napig. 7-10 perccel később használjunk klórhexidin tartalmú fertőtlenítő oldatot (Clorexyderm Oldat). Antibiotikum szájon át történő adagolása javasolt minimum 4 hétig.

Krónikus vagy visszatérő fülgyulladás esetén: tisztítsuk meg a külső hallójáratot naponta egyszer. Cseppentsünk 2-5 ml Before X-et a külső hallójáratba naponta kétszer 7 napig. Töröljük ki a hallójáratot, és ezután alkalmazhatunk további kezelést (pl. Clorexyderm Oto, Clorexyderm Spot Gel, antibiotikumok) naponta kétszer 7 napon keresztül. Antibiotikum szájon át történő adagolása javasolt minimum 3 hétig.

Fisztula és tályog esetén: használjunk naponta Before X-et a fisztula kitisztítására a megfelelő antibiotikum használata előtt.

Kiszerezése:

250 ml-es steril infúziós palackban.

